

SMARTLIPO & LIPOTRANSFER

PRE-OPERATORIO

1. Transamin 250mg, 8 tabletas.
2. Adona 30mg, 4 tabletas.
3. Velocef 1 gr. 1 ampolla.
4. Transamin 250 mg, 1 ampolla.
5. Hanalgeze 60mg, 1 ampolla.

Indicaciones para evitar moretones (equimosis):

1. Transamin 250mg. Tomar 2 tabletas cada 8hrs: 8am - 4pm - 12am, un día antes de la cirugía.

2. Adona 30mg. Tomar 4 tabletas, 1 hora antes del tratamiento.

Debe Traer para aplicar antes del procedimiento:

3. Velocef 1 gr. 1 ampolla.
4. Transamin 250 mg. 1 ampolla.
5. Hanalgeze 60mg, 1 ampolla.

Nota: Si olvida traer las ampollas deberá adquirirlas en la clínica a s/.70.00.

POST-OPERATORIO

1. Ciprolin 500mg, 10 tabletas.
2. Medrodol 500mg, 10 tabletas.
3. Hanalgeze 60 mg, 3 ampollas.
4. Vitamina K 5% ó Auriderm, 1 frasco.
5. Gentalyn 160mg, 3 ampollas.
6. Feranin bebible, 5 ampollas.

Indicaciones:

1. Ciprolin 500mg. Tomar una tableta cada 12hrs por 5 días.

2. Medrodol 500mg. Tomar una tableta cada 8hrs por 3 días.

3. Hanalgeze 60 mg, Se aplicara de acuerdo a la necesidad del paciente.

4. Vitamina K 5% ó Auriderm ; Aplicar cada 3 hrs en el área de equimosis (moretones).

5. Gentalyn 160mg, Aplicar una ampolla intramuscular cada 24hrs por 3 días.

6. Feranin bebible, Tomar una ampolla con un vaso de limonada o jugo de naranja una vez al día por una semana.

Nota: Los medicamentos pueden variar de acuerdo a indicación médica.

PREPARACIÓN:

- No Fumar 6 semanas antes del procedimiento.
- No consumir ningún tipo de anticoagulantes (Ej.aspirinas, vitaminas E, entre otros).
- No consumir bebidas alcohólicas 48 hrs antes.
- Evitar exposición solar 48 horas antes.

PRE - OPERATORIO:

Exámenes Auxiliares

- EKG y Riesgo Quirúrgico.
- Exámen de Sangre PRE-OPERATORIO
- Examen HCG./ Exámen de orina.

Importante

- Si presenta alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión u otra) debe tomar su medicación de acuerdo a indicación médica.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

- Asistir en ayunas 6 horas antes del tratamiento.
- Asistir en compañía de un familiar.
- Asistir a la clínica 1 hora antes de su programación.
- Traer los medicamentos indicados en la consulta.
- No asistir a la clínica con su vehículo debido a que no debe conducir si ha recibido sedación endovenosa.
- Asistir con camisa/blusa con botones delanteros.
- Asistir con buzo o ropa holgada.

Recomendaciones Post-Operatorias:

- Asistir para curacion y drenaje por 4 días consecutivos.
- Usar faja post-operatoria por 30 días.
- Puede realizar masajes post-operatorios aproximadamente por 15 días.
- No consumir: frituras, pastas, tabaco, bebidas gaseosas, pescados, mariscos, cerdo, carnes rojas, ají, condimentos.
- Consumir: carnes blancas, frutas, verduras, abundante líquido.
- No exposición solar por 30 días.
- No consumir bebidas alcohólicas por 15 días.
- No realizar ejercicios físicos por 30 días.

* La Curación de los días domingos ó feriados realizados en la clínica tendrán un costo de S/. 30.00 (no incluye ampollas).

* Si desea curación a domicilio el costo será de s/.60.00 (No incluye ampollas)

* Las guardias turno noche por 12 horas tendrán un costo de s/.200.00 que incluyen enfermería, cena y desayuno. (No incluyen medicamentos post operatorios).

FECHA: / /

Nombres y Apellidos: _____

FIRMA DEL PACIENTE

EN CASO DE NECESITAR HACER ALGUNA CONSULTA LLAMAR.

Clínica: 250-0707 / 364-8066 | Médico Especialista : 948 590 286

SMARTLIPO es una técnica quirúrgica a través de la cual se eliminan las células grasas debajo de la piel.

Consiste en aspirar a través de cánulas, depósitos de grasa localizada que no ceden con dietas ni ejercicios. No se trata de una cura para la obesidad. Por el contrario, es una forma de tratar el contorno corporal. Es preferencialmente indicada para pacientes con piel de buena elasticidad y consistencia. En estos casos, la lipoaspiración produce resultados excelentes.

El tipo de liposucción que utilizamos es la liposucción tumescente, es decir, que en dicha cirugía utilizaremos grandes cantidades de anestesia local pero muy diluida (es un tipo de liposucción que funciona sin anestesia general ó epidural). De esta manera, se pueden trabajar zonas específicas del cuerpo sin la necesidad de dormir al paciente, solo se le dará una sedación intravenosa leve (administrada por un anestesiólogo calificado), en el cual el paciente no estará completamente dormido y podrá responder a estímulos verbales. La anestesia general siempre supone un riesgo para los pacientes por lo que la utilización de anestesia local ha sido un gran avance dentro del mundo de las liposucciones. Se considera que la anestesia local es una de las formas más seguras de anestesia, entre otras cosas porque su efecto dura mucho tiempo y no es necesario volver a sedar al paciente con narcóticos después de realizar la intervención para evitar los dolores posteriores.

LIPOTRANSFER es uno de los métodos más novedosos que tiene la cirugía estética; este consiste en extraer grasa de ciertas zonas del cuerpo mediante una liposucción y colocarla en otra zona que necesite la corrección de imperfecciones y/o para dar más volumen en una zona específica que deseemos.

Procedimiento Quirúrgico :

La anestesia utilizada es local con sedación, dependiendo de la extensión de las áreas a ser aspiradas

Debajo de la piel, y basada en la experiencia del cirujano, se selecciona una cantidad de grasa que va a ser retirada, aspirada por finísimas cánulas, teniendo siempre cuidado de dejar una pequeña porción de grasa necesaria para el organismo, principalmente para la nutrición de la piel y para que no ocurra imperfecciones como hueco y/u ondulaciones. A continuación, las incisiones son dejadas abiertas para que durante el post-operatorio todo líquido pueda ser drenado y así evitar seromas. El acto quirúrgico tiene una duración media de 30 minutos a 1 hora por cada sesión.

Lipotransfer: El primer paso es saber la cantidad de tejido graso (también conocido como tejido adiposo) que necesitamos para conseguir el resultado deseado y saber si tenemos esa cantidad de tejido sobrando para poder extraerlo y realizar la lipotransferencia. Luego de esto, dependiendo de la cantidad de tejido graso que necesitemos, la extracción se realizará de una u otra forma; si lo que queremos de este proceso es un aumento de glúteos, la cantidad de grasa necesaria es más elevada, por lo que será necesario realizar una liposucción en la parte abdominal ó las caderas para conseguirla, ya que esas son las zonas con mayor porcentaje de células madre mesenquimales, las cuales son capaces de reproducirse en cualquier otro linaje de células sin problema alguno. Esta demás decir que este proceso tiene que realizarse con utensilios esterilizados y en espacios dispuestos para tal fin para así evitar cualquier tipo de contaminación de la grasa extraída ó de la zona final. Luego de extraído el tejido adiposo, este se debe separar de otros componentes, ya que es extraído junto a sangre y otros tejidos. Son lavadas con suero fisiológico al 0,9% para quitar dichos componentes y posteriormente, la grasa es decantada para extraer sólo el tejido graso; proceso que realizamos para conseguir que la grasa a transferir sea lo más pura posible; y así, disminuir los porcentajes de reabsorción y que el cuerpo la asimile más rápidamente.

El siguiente paso es reubicar la grasa ya filtrada y procesada en la zona que se desea remoldar ó aumentar. Es decir, ya llegamos a la fase final de la lipotransferencia.

Riesgo ó incertidumbre :

Como todo procedimiento quirúrgico la liposucción tiene riesgos inherentes y que en la mayoría de casos pueden evitarse con una técnica quirúrgica meticulosa y un análisis pre-quirúrgico cuidadoso.

Las complicaciones mayores son la hemorragia que puede causar choque hipovolémico, trombosis venosa y el subsecuente embolismo pulmonar, así como el embolismo graso, el edema pulmonar y el infarto cardíaco.

Localmente, es la áreas intervenidas, también se pueden presentar deformidades ó irregularidades del contorno, hipoestesia (disminución de la sensibilidad) de la piel localizada sobre el área liposucionada (que puede durar meses en recuperarse), equimosis (moretones) extensas que pueden resolverse parcialmente quedando manchas por acumulación de hemoderina (es por eso que se le indica al paciente protección contral al sol), edema localizado (hinchazón) después de culminada la cirugía, el cual se recomienda realizarse sus drenajes linfáticos para disminución de esta; aparición de seromas e infecciones que van desde las leves hasta las correspondientes a una fascitis necrotizante .

Las fallas en la técnica también puede llevar a asimetrías, quedando una zona del cuerpo más prominente que la otra, a sobrecorrección que deja una depresión en la piel y que luego hay que corregirlas con un lipoinjerto ó a falta de corrección teniendo que hacer una segunda liposucción.

En general, usted comenzará a percibir las diferencias en sus medidas después de 30 días ya que la desinflamación post-quirúrgico al 70% se dará en ese lapso.

Las primeras semanas las áreas tratadas se hincharán y podrán presentar algunos lugares más densos que otros, y tienden a desaparecer a los 15 días y hasta 3 meses después de la operación.

La cirugía solo podrá ser realizada si el paciente se encuentra en buen estado general y con resultados de los análisis y exámenes auxiliares dentro de los límites normales.

Los resultados de la cirugía pueden variar de acuerdo a la respuesta del propio paciente.

La cirugía puede suspenderse ó postergarse si no hubiera la aprobación del médico especialista aún teniendo los exámenes pre-aprobados por razones inherentes a la cirugía y/o expectativa al paciente.